

甘肃省药品监督管理局

甘肃省中药炮制规范

藤 黄

Tenghuang

GARCINIAE RESINA

【处方用名】 生藤黄，制藤黄。

【来源】 本品为藤黄科植物藤黄 *Garcinia hanburyi* Hook.f.的胶质树脂。主产于印度、泰国、越南、柬埔寨、印度尼西亚等地。8~9月采收，取凝固的树胶，煮至熔融，置竹筒中凝成筒状，取出，干燥。

药材以半透明、内外均为红黄色、断面似蜡质样者为佳。

【炮制方法】 **生藤黄** 取原药材，除去杂质，打成碎块或研成细粉。

制藤黄 (1) 取大块豆腐，中间挖槽，取净藤黄放于槽中，用豆腐盖严。置锅内，加水煮沸，至藤黄溶化时，取出，放凉，待藤黄凝固，除去豆腐，干燥。

(2) 取大块豆腐，中间挖槽，取净藤黄放入槽中，用豆腐盖严，置蒸笼内，蒸3~4小时，至藤黄全部溶化，取出，放凉，待藤黄凝固，除去豆腐，干燥。

每净藤黄1kg，用豆腐8kg。

【饮片规格】 **生藤黄** 不规则碎块或细粉。

制藤黄 不规则块状，深黄色。

【成品性状】 **生藤黄** 本品呈不规则碎块状或细粉状。红黄色或橙棕色。碎块外被黄绿色粉霜，有纵条纹，质脆易碎。断面光滑，气微，味辛辣。

制藤黄 呈不规则块状，表面棕黄色或棕色。气微，味辛辣。

【性味与归经】 酸、涩，寒；有大毒！归胃、大肠经。

【功能与主治】 消肿排脓，散郁解毒，杀虫止痒。用于痈疽肿毒，顽癣，跌打损伤。

【用法与用量】 0.03~0.06g，制后入丸散剂。外用适量，研末调敷，磨汁涂或熬膏涂患处。

起草单位：甘肃省药品检验研究院

起草人：王娟弟，李敏，李冬华，张明童

【处方应付】 写生藤黄付生藤黄(仅外用)；写藤黄、制藤黄付制藤黄。

【注意】 本品有大毒，一般外用，内服宜慎。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【附注】 炮制时不宜口尝，操作后必须洗手。用过的豆腐及蒸液应妥善处理。按有关毒剧药品管理规定执行。

起草单位：甘肃省药品检验研究院

起草人：王娟弟，李敏，李冬华，张明童